



ALLEGATO 9

DGR 2 febbraio 2018, n. 12-6441: Area di ricarica degli acquiferi profondi
modifica della definizione del limite di monte della fascia tampone

LEGENDA



Depositi fluvio-torrentizi antichi (pianura pinerolese "Rilievo di Riva") del Pleistocene medio.
Ghiaie, ciottoli e blocchi in matrice sabbioso-limoso. Presenza di paleosuolo intensamente alterato, caratterizzato dalla marcata colorazione rossastra.
Massimo spessore stimabile in 50 m circa.



Depositi fluvio-torrentizi del Pleistocene medio ("pediment" o "glacis").
Ciottoli e blocchi in matrice ghiaioso-sabbiosa (colorazione rossastra legata a fenomeni di argillificazione della matrice; presenza di paleosuoli).
Massimo spessore stimabile in 80 m circa presso loc. "Cappella dei Galletti".



Affioramenti e sezioni naturali dei depositi pleistocenici del "pediment".

Substrato roccioso

Substrato roccioso subaffiorante o mascherato dalla copertura detritico-colluviale di potenza variabile, in genere, inferiore ai 3 metri.



Ortogneiss del Monte Freidour
Gneiss occhiadini con associati gneiss aplitici.

Substrato roccioso in affioramento.

Localmente, sulle superfici esposte dei litotipi del Complesso di Pinerolo, è valutabile la presenza dell'orizzonte regolitico di alterazione caratterizzato da spessori generalmente inferiori ad 1 metro.



Complesso grafítico di Pinerolo
Micascisti grafíticos e grafítoscisti con subordinate intercalazioni di gneiss minuti e gneiss conglomeratici



DGR 2 febbraio 2018, n. 12-6441: Area di ricarica degli acquiferi profondi



Area di ricarica in senso stretto



Fascia tampone



Modifica limite "superiore" fascia tampone a seguito degli approfondimenti geologici

scala 1:10.000

